Atenfe ®
Adalimumab

40 mg/0,4 ml
80 mg/0,8 ml
Solución inyectable
Vía de administración: Subcutánea

venta bajo receta archivada INDUSTRIA ISLANDESA

COMPOSICIÓN
Cada jeringa precargada de ATENFE® 40 mg solución contiene: Adalimumab 40 mg. Excipientes: cloruro de sodio 0,23 mg, Sacarosa 34,9 mg, Polisorbato 80 0,40 mg, agua para inyectables c.s.p 0,4 ml.
Cada jeringa precargada de ATENFE® 80 mg solución contiene: Adalimumab 80 mg. Excipientes: cloruro de sodio 0,46 mg, Sacarosa 69,8 mg, Polisorbato 80 0,80 mg, agua para inyectables c.s.p 0,8 ml.
Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano recombinante producido en células de Ovario de Hámster Chino.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Código ATC: L04AB04
Inmunosupresores, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα).

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Artritis reumatoide
ATENFE® en combinación con metotrexato, está indicado para:
- El tratamiento de la artritis reumatoide activa moderada a grave en pacientes adultos, cuando la respuesta a fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAMEs) incluyendo metotrexato haya sido insuficiente.
- El tratamiento de la artritis reumatoide activa, grave y progresiva en adultos no tratados previamente con metotrexato.

ATENFE® puede ser administrado como monoterapia en caso de intolerancia al metotrexato o cuando el tratamiento continuado con metotrexato no sea posible.
Adalimumab ha demostrado reducir la tasa de progresión del daño de las articulaciones medido por rayos X y mejorar el rendimiento físico, cuando se administra en combinación con metotrexato.

Artritis idiopática juvenil
Artritis idiopática juvenil poliarticular
ATENFE® en combinación con metotrexato está indicado para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil poliarticular activa en pacientes a partir de 2 años que han presentado una respuesta insuficiente a uno o más FAME. ATENFE® puede ser administrado en monoterapia en caso de intolerancia al metotrexato o cuando el tratamiento continuado con metotrexato no sea posible. (Ver Propiedades Farmacodinámicas). No se ha estudiado el uso de Adalimumab en pacientes menores de 2 años.
Artritis asociada a entesitis
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la artritis asociada a entesitis activa en pacientes a partir de 6 años que han presentado una respuesta insuficiente, o son intolerantes, al tratamiento convencional. (Ver Propiedades Farmacodinámicas).

Espondiloartritis axial
Espondilitis anquilosante (EA)
ATENFE® está indicado para el tratamiento de adultos con EA activa grave que hayan presentado una respuesta insuficiente al tratamiento convencional.
Espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA
ATENFE® está indicado para el tratamiento de adultos con espondiloartritis axial grave sin evidencia radiográfica de EA, pero con signos objetivos de inflamación por elevada Proteína C Reactiva (PCR) y / o Imagen por Resonancia Magnética (IRM), que presentan una respuesta insuficiente o son intolerantes a fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

Artritis psoriásica
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en adultos cuando la respuesta a la terapia previa con FAME haya sido insuficiente. Se ha demostrado que Adalimumab reduce la progresión del daño en las articulaciones periféricas medido por rayos X en pacientes que presentaban el patrón poliarticular simétrico de la enfermedad y que mejora la función física de los pacientes.

Psoriasis
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas crónica de moderada a grave en pacientes adultos que sean candidatos para un tratamiento sistémico.

Psoriasis pediátrica en placas
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la psoriasis crónica en placas grave en niños y adolescentes desde los 4 años de edad que hayan presentado una respuesta inadecuada o no sean candidatos apropiados para tratamiento tópico y fototerapias.

Hidradenitis supurativa (HS)
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la HS activa (acné inversa) de moderada a grave en pacientes adultos y adolescentes a partir de 12 años con una respuesta insuficiente al tratamiento sistémico convencional de HS.

Enfermedad de Crohn
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa de moderada a grave, en pacientes adultos que no hayan respondido a un tratamiento completo y adecuado, con corticosteroides y/o inmunosupresores, o que son intolerantes o tienen contraindicaciones médicas para dichos tratamientos.

Enfermedad de Crohn pediátrica
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa de moderada a grave en pacientes pediátricos (a partir de los 6 años) que han presentado una respuesta insuficiente al tratamiento convencional incluyendo tratamiento nutricional primario y un corticosteroide y/o un inmunomodulador, o que son intolerantes o tienen contraindicaciones dichos tratamientos.

Colitis ulcerosa
ATENFE® está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada al tratamiento convencional, incluidos corticosteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones médicas a dichos tratamientos.

Colitis ulcerosa pediátrica
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la colitis ulcerosa activa de moderada a grave en pacientes pediátricos (a partir de 6 años) que han presentado una respuesta insuficiente al tratamiento convencional con corticosteroides y/o 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o que son intolerantes o están contraindicados para dichos tratamientos.

Uveítis
ATENFE® está indicado en el tratamiento de la uveítis no infecciosa intermedia y posterior y panuveítis en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada a corticosteroides, que necesitan disminuir su tratamiento con corticosteroides, o en aquellos en los que el tratamiento con corticosteroides sea inapropiado.

Uveítis pediátrica
ATENFE® está indicado para el tratamiento de la uveítis pediátrica anterior crónica no infecciosa en pacientes desde los 2 años de edad, que han tenido una respuesta inadecuada o son intolerantes a la terapia convencional, o en los que la terapia convencional no es adecuada.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Mecanismo de acción
Adalimumab se une específicamente al TNF (Factor de necrosis tumoral) y neutraliza su función biológica al bloquear su interacción con los receptores p55 y p75 del TNF en la superficie celular. Adalimumab también modula la respuesta biológica inducida o regulada por el TNF, incluyendo cambios en los niveles de las moléculas de adhesión responsables de la migración leucocitaria (ELAM-1, VCAM-1, e ICAM-1 con una CI50 de 0,1–0,2 nM.

Farmacodinamia
Tras el tratamiento con Adalimumab, se observó una rápida disminución de los niveles de los componentes de fase aguda de inflamación (proteína C reactiva, PCR) y velocidad de sedimentación globular (VSG) y de las citoquinas plasmáticas (IL-6) en comparación con el inicial en pacientes con artritis reumatoide. Los niveles plasmáticos de metaloproteinasas (MMP-1 y MMP-3) que participan en la remodelación tisular responsable de la destrucción del cartílago también disminuyeron tras la administración de Adalimumab. Los pacientes tratados con Adalimumab generalmente experimentaron mejorías en los signos hematológicos de inflamación crónica.
En pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa e HS se ha observado un rápido descenso en los niveles de Proteína C reactiva (PCR), tras el tratamiento con Adalimumab. En pacientes con enfermedades de inflamación crónica, se observaron descensos en el número de células que expresan marcadores inflamatorios en el colon, incluyendo una reducción significativa en la expresión del TNFα. Los estudios endoscópicos de la mucosa intestinal han mostrado evidencias de cicatrización de mucosa en pacientes tratados con Adalimumab.

Farmacocinética
Absorción y distribución
La absorción y distribución de Adalimumab tras la administración subcutánea de una dosis única de 40 mg, fue lenta, alcanzándose las concentraciones plasmáticas máximas a los 5 días después de la administración. La media de biodisponibilidad absoluta de Adalimumab fue del 64 %, estimada a partir de tres ensayos realizados con el medicamento de referencia con una dosis subcutánea única de 40 mg.
Tras la administración intravenosa de dosis única en un rango de 0,25 a 10 mg/kg, las concentraciones fueron proporcionales a la dosis. Tras la administración de dosis de 0,5 mg / kg (~40 mg), el aclaramiento osciló en el rango de 11 a 15 ml / hora, con un volumen de distribución (Vss) entre 5 y 6 litros, y la semivida media de eliminación terminal fue aproximadamente dos semanas. Las concentraciones de Adalimumab en el líquido sinovial, determinadas en pacientes con artritis reumatoide, oscilaron entre el 31 y el 96 % de las plasmáticas.
Tras la administración subcutánea de 40 mg de Adalimumab en semanas alternas en pacientes adultos con artritis reumatoide (AR), la media de las concentraciones en el punto mínimo en el estado estacionario fue aproximadamente 5 microgramos/ml (ni tras concomitante administración de metotrexato) y 8 a 9 microgramos /ml con metotrexato concomitante). Los niveles plasmáticos de Adalimumab en el estado estacionario aumentaron más o menos proporcionalmente con la dosis tras la administración subcutánea de 20, 40 y 80 mg en semanas alternas y cada semana.
Tras la administración subcutánea en semanas alternas de 24 mg/m² (hasta un máximo de 40 mg) en pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular (AIJ), que tenían entre 4 y 17 años, la concentración plasmática media de Adalimumab en estado estacionario fue de 5,2 microgramos/ml (rango de 3,3 a 8,0 microgramos/ml) con Adalimumab sin metotrexato concomitante y 10,9 + 5,2 µg/ml (47,7% CV) con metotrexato concomitante.
En pacientes con AIJ poliarticular que tenían de 2 a <4 años o de 4 años o más y un peso <15 kg dosificados con 24 mg/m² de Adalimumab, la concentración plasmática media de Adalimumab en estado estacionario fue de 5,1 microgramos/ml (0,91%CV) para Adalimumab sin metotrexato concomitante y 7,9 + 5,3 µg/ml (71,2%CV) con metotrexato concomitante.
Tras la administración de 24 mg/m² (hasta un máximo de 40 mg) por vía subcutánea en semanas alternas en pacientes de 4 a 17 años con artritis asociada entesitis, la concentración media de Adalimumab en estado estacionario (valores medidos en la Semana 24) fue de 8,8 +6,6 µg/ml para Adalimumab sin metotrexato concomitante y 11,8 + 4,3 µg/ml con metotrexato concomitante.
Tras la administración subcutánea de 0,8 mg/kg (hasta un máximo de 40 mg) en semanas alternas a pacientes pediátricos con psoriasis en placas crónica, la mínima (+ DS) de las concentraciones de Adalimumab en el punto mínimo del estado estacionario fue 7,4 + 5,3 µg/ml (71% CV).
En pacientes adultos con HS, con una dosis de 160 mg de Adalimumab en la Semana 0 seguido de 80 mg en la Semana 2 se alcanzaron concentraciones séricas mínimas de Adalimumab de aproximadamente 7 ± 8 µg/ml en la Semana 2 y la Semana 4. La concentración media en el estado estacionario en la Semana 12 hasta la Semana 36 fue aproximadamente de 8 a 15 µg/ml durante el tratamiento con 40 mg semanal.
La exposición de Adalimumab en pacientes adolescentes con HS se predijo usando modelos de farmacocinética poblacional y simulación basado en la farmacocinética del conjunto de indicaciones en otros pacientes pediátricos (psoriasis pediátrica, artritis idiopática juvenil y artritis asociada a entesitis). La pauta posológica recomendada para HS en adolescentes es 40 mg en semanas alternas. Debido a que la exposición de Adalimumab se puede ver afectada por el tamaño corporal, los adolescentes con mayor peso corporal y una respuesta inadecuada se pueden beneficiar de la dosis recomendada en adultos de 40 mg semanales.
En pacientes con enfermedad de Crohn, con la dosis de carga de 80 mg de Adalimumab en la Semana 0, seguida de 40 mg de Adalimumab en la Semana 2, se alcanzaron concentraciones plasmáticas mínimas de Adalimumab de aproximadamente 5,5 microgramos/ml durante el periodo de inducción. Con la dosis de carga de 160 mg de Adalimumab en la Semana 0, seguida de 80 mg de Adalimumab en la Semana 2, se alcanzaron concentraciones plasmáticas mínimas de Adalimumab de aproximadamente 12 microgramos/ml durante el periodo de inducción. Se observaron niveles medios en el punto mínimo en el estado estacionario de aproximadamente 7 microgramos/ml en pacientes con colitis ulcerosa que recibieron una dosis de mantenimiento de 40 mg de Adalimumab en semanas alternas.
En pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn de moderada a grave, la dosis de inducción con Adalimumab fue de 160/80 mg o 80/40 mg en las Semanas 0 y 2, respectivamente, dependiendo de un corte de 40 kg de peso corporal. En la Semana 4, los pacientes fueron aleatorizados 1:1 en grupos de tratamiento de mantenimiento según su peso corporal a la Dosis Estándar (40/20 mg en semanas alternas) o Alta Dosis (20/10 mg en semanas alternas). La media (+ DS) de la concentración sérica valle de Adalimumab alcanzada en la Semana 4 fue 15,7+6,6 µg/ml para pacientes > 40 kg (160/80 mg) y 10,4+6,1 µg/ml para pacientes < 40 kg (80/40 mg).
Para aquellos pacientes que permanecieron en el tratamiento aleatorizado, la media (+DS) de la concentración valle de Adalimumab en la Semana 52 fue de 11,5+5,4 µg/ml para el grupo de la Dosis Estándar y 15+2,2 µg/ml para el grupo de Dosis Bajas. Se marcó la media de las concentraciones valle en los sujetos que continuaron el tratamiento con Adalimumab en semanas alternas durante 52 semanas. Para aquellos pacientes en los que se produjo una escalada de dosis del régimen de semanas alternas a semanal (a media (+ DS) de las concentraciones séricas de Adalimumab en la Semana 52 fueron 13,3+11,4 µg/ml (40/20 mg semanalmente) y 6,7+3,5 (20/10 mg semanalmente).
En pacientes con colitis ulcerosa, con la dosis de carga de 160 mg de Adalimumab en la Semana 0, seguida de 80 mg de Adalimumab en la Semana 2 se alcanzan concentraciones plasmáticas mínimas de Adalimumab de aproximadamente 12 microgramos/ml durante el periodo de inducción. Se observaron niveles medios en el punto mínimo en el estado estacionario de 8 microgramos/ml en pacientes con colitis ulcerosa que recibieron una dosis de mantenimiento de 40 mg de Adalimumab en semanas alternas.
Tras la administración subcutánea de una dosis basada en el peso corporal de 0,6 mg/kg (máximo de 40 mg) en semanas alternas en pacientes pediátricos con colitis ulcerosa, la concentración sérica media de Adalimumab en el punto mínimo del estado estacionario fue de 5,01 + 3,28 µg/ml en la semana 52.
Para pacientes que recibieron 0,6 mg/kg (máximo de 40 mg) cada semana, la concentración sérica media (+ DE) de Adalimumab en el punto mínimo del estado estacionario fue de 15,7 + 5,60 µg/ml en la semana 52.
En el caso de que esté indicado el retratamiento con Adalimumab, se deben seguir las indicaciones anteriores en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento.
La seguridad de Adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis en placas ha sido evaluada durante una media de 13 meses.
No existe una recomendación de uso específica para Adalimumab en niños menores de 4 años para esta indicación.

Peso del Paciente	Pauta Posológica
15 kg hasta < 30 kg	*
> 30 kg	Dosis inicial de 40 mg, seguida de 40 mg administrados en semanas alternas empezando una semana después de la dosis inicial.

La continuación del tratamiento más allá de 16 semanas se debe reconsiderar de forma cuidadosa en pacientes que no hayan respondido en este periodo de tiempo.
En el caso de que esté indicado el retratamiento con Adalimumab, se deben seguir las indicaciones anteriores en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento.
La seguridad de Adalimumab en pacientes pediátricos con psoriasis en placas ha sido evaluada durante una media de 13 meses.
No existe una recomendación de uso específica para Adalimumab en niños menores de 4 años para esta indicación.

Hidradenitis supurativa en adolescentes la parte de 12 años de edad, con un peso de al menos 30 kg)
No hay ensayos clínicos con Adalimumab en pacientes adolescentes con HS. La posología de Adalimumab en estos pacientes se ha determinado a partir de modelos farmacocinéticos y simulación.
La dosis recomendada de ATENFE® es de 80 mg en la Semana 0 seguida de 40 mg en semanas alternas comenzando en la Semana 1 mediante inyección subcutánea.
En pacientes adolescentes con una respuesta inadecuada a ATENFE® 40 mg en semanas alternas, se puede considerar un incremento de la dosis a 40 mg semanales o a 80 mg cada dos semanas.
Si es necesario se puede continuar el tratamiento con antibióticos durante el tratamiento con ATENFE®. Durante el tratamiento con ATENFE® se recomienda que el paciente utilice a diario un líquido antiséptico tópico en las lesiones de hidradenitis supurativa.
La continuación del tratamiento más allá de 12 semanas se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan mejorado en este periodo de tiempo.
Si se necesita interrumpir el tratamiento, se puede reintroducir ATENFE® según proceda.
Se debe evaluar periódicamente el balance beneficio/riesgo del tratamiento continuado a largo plazo.
El uso de Adalimumab en niños menores de 12 años para la indicación de hidradenitis supurativa no es relevante.

Enfermedad de Crohn pediátrica
La dosis recomendada de ATENFE® para pacientes con enfermedad de Crohn desde los 6 hasta los 17 años se basa en el peso corporal (Tabla 4). ATENFE® se administra en inyección por vía subcutánea.
Tabla 4, Dosis de Adalimumab para pacientes pediátricos con enfermedad de Crohn

Peso del Paciente	Dosis de inducción	Dosis de Mantenimiento empezando en la semana 4
< 40 kg	-40 mg en la semana 0 y 20 mg en la semana 2 En caso de que sea necesaria una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que el riesgo de los efectos adversos podría aumentar,se usa en la dosis de inducción mayor, puede usarse la siguiente dosis: -80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 2.	-
> 40 kg	-80 mg en la semana 0 y 40 mg en la semana 2. En caso de que sea necesaria una respuesta más rápida al tratamiento siendo conscientes de que el riesgo de los efectos adversos podría aumentar,se usa en la dosis de inducción mayor, puede usarse la siguiente dosis: -160 mg en la semana 0 y 80 en la semana 2	40 mg en semanas alternas

Pacientes que tengan una respuesta insuficiente pueden beneficiarse de un aumento de la dosis:
- 40 kg: 20 mg cada semana
- > 40 kg: 40 mg cada semana o 80 mg cada dos semanas.

El tratamiento continuado se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no hayan respondido en la semana 12.
El uso de Adalimumab en niños menores de 4 años para la indicación de enfermedad de Crohn no es relevante.

Colitis ulcerosa pediátrica
La dosis recomendada de ATENFE® para pacientes de 6 a 17 años con colitis ulcerosa se basa en el peso corporal (Tabla 5). ATENFE® se administra mediante inyección subcutánea.
Tabla 5, Dosis de Adalimumab para pacientes con colitis ulcerosa

Peso del Paciente	Dosis de inducción	Dosis de Mantenimiento Comienza en la semana*
< 40 kg	- 80 mg en la semana 0 (administrados como dos inyecciones de 40 mg en un día) o (administrados como una inyección de 80 mg) y -40 mg en la semana 2 (administrados como una inyección de 40 mg)	40 mg en semanas alternas
> 40 kg	- 160 mg en la semana 0 (Administrados como cuatro inyecciones de 40 mg en un día o dos inyecciones de 40 mg al día en dos días consecutivos) o administrados como dos inyecciones de 80 mg en un día o una inyección de 80 mg al día en dos días consecutivos) y - 80 mg en la semana 2 (administrados como dos inyecciones de 40 mg en un día) o (Administrados como una inyección de 80 mg)	80 mg en semanas alternas

* Los pacientes pediátricos que cumplan 18 años durante el tratamiento con ATENFE® deben continuar con la dosis de mantenimiento prescrita.
El tratamiento continuado tras 8 semanas se debe reconsiderar, de forma cuidadosa, en pacientes que no muestran signos de respuesta transcurrido este tiempo.
El uso de ATENFE® en niños menores de 6 años para la indicación no es relevante.

Uveítis pediátrica
La dosis recomendada de ATENFE® en pacientes pediátricos con uveítis desde los 2 años se basa en el peso corporal (Tabla 6). ATENFE® se administra en inyección por vía subcutánea.
En ensayos clínicos, no hay experiencia en el tratamiento con Adalimumab sin un tratamiento concomitante con metotrexato.
Tabla 6, Dosis de Adalimumab para pacientes pediátricos con uveítis

Peso del Paciente	Pauta Posológica
< 30 kg	40 mg en semanas alternas en combinación con metotrexato
> 30 kg	

Cuando se inicie la terapia con ATENFE®, se puede administrar una dosis de carga de 40 mg para pacientes de < 30 kg o de 80 mg para pacientes > 30 kg una semana antes de iniciar la terapia de mantenimiento. No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de una dosis de carga de Adalimumab en niños menores de 6 años.
No se ha estudiado el uso de Adalimumab en niños menores de 2 años en esta indicación.
Se recomienda evaluar anualmente el beneficio y el riesgo en tratamientos continuados a largo plazo.

Contraindicaciones
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (Ver composición).
- Tuberculosis activa u otras infecciones graves tales como sepsis, e infecciones oportunistas
- Insuficiencia cardiaca moderada a grave (NYHA clases III/IV).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Infecciones
Los pacientes que están en tratamiento con antagonistas del TNF son más susceptibles de padecer infecciones graves. La función pulmonar alterada puede incrementar el riesgo de desarrollar infecciones. Los pacientes deben ser, por lo tanto, estrechamente monitorizados para la detección de infecciones (incluyendo tuberculosis), antes, durante y después del tratamiento con ATENFE®. Dado que la eliminación de Adalimumab puede tardar hasta cuatro meses, la monitorización se debe continuar durante este periodo.
El tratamiento con ATENFE® no se debe iniciar en pacientes con infecciones activas, incluyendo infecciones crónicas o localizadas, hasta que las infecciones estén controladas. Se debe considerar el riesgo y el beneficio antes de iniciar el tratamiento con ATENFE® en pacientes que han estado expuestos a tuberculosis y en pacientes que han viajado a áreas de alto riesgo de tuberculosis o áreas endémicas de micosis, como histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis (ver Otras infecciones oportunistas).
Los pacientes que desarrollan una nueva infección mientras están bajo tratamiento con ATENFE® deben ser estrechamente monitorizados y someterse a una evaluación diagnóstica completa. La administración de ATENFE® debe interrumpirse si un paciente desarrolla una infección grave nueva o sepsis, y se debe iniciar el tratamiento antimicrobiano o antifúngico apropiado hasta que la infección esté controlada. Los médicos deben tener precaución cuando consideren el uso de Adalimumab en pacientes con antecedentes de infección recurrente o con condiciones subyacentes que puedan predisponer a los pacientes a infecciones, incluido el uso concomitante de medicamentos inmunosupresores.

Procesos autoinmunes
El tratamiento con ATENFE® puede dar lugar a la formación de autoanticuerpos. Se desconoce el impacto del tratamiento a largo plazo con Adalimumab sobre el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Si un paciente desarrolla síntomas parecidos a los de un síndrome tipo lupus después del tratamiento con ATENFE® y es positivo para anticuerpos frente a dsADN, se debe interrumpir el tratamiento con ATENFE®.

Administración concomitante de FAMEs biológicos o antagonistas del TNF
En ensayos clínicos se han observado infecciones graves con el uso concurrente de anakinra y otro antagonista del TNF, etanercept, sin beneficio clínico añadido en comparación con el uso de etanercept solo. Por la naturaleza de las reacciones adversas observadas con la combinación de etanercept con anakinra, la combinación de anakinra y otros antagonistas del TNF puede producir una toxicidad similar. Por lo tanto, no se recomienda la combinación Adalimumab y anakinra.
Basándose en el posible incremento del riesgo de infecciones, incluyendo infecciones graves, y otras interacciones farmacológicas potenciales, no se recomienda la administración concomitante de Adalimumab con otros FAMES biológicos (por ejemplo, anakinra y abatacept) u otros antagonistas del TNF.

Cirugía
La experiencia de seguridad de intervenciones quirúrgicas en pacientes tratados con Adalimumab es limitada. Si se planifica una intervención quirúrgica debe considerarse la larga semivida de eliminación de Adalimumab. Los pacientes tratados con ATENFE® que requieran cirugía, deben controlarse muy de cerca por la aparición de infecciones y tomar las medidas apropiadas. La experiencia de seguridad en los pacientes a los que se les trata de practicar una artroplastia, mientras estaban en tratamiento con Adalimumab, es limitada.

Obstrucción del intestino delgado
Un falso en la respuesta al tratamiento para la enfermedad de Crohn puede indicar la presencia de estenosis fibróticas establecidas que requieren tratamiento quirúrgico. Los datos disponibles sugieren que Adalimumab no empeora ni causa las estenosis.

Pacientes de edad avanzada
La frecuencia de infecciones graves en sujetos mayores de 65 años (3,7 %) tratados con Adalimumab fue mayor que para aquellos menores de 65 años (1,5 %). Algunas de dichas infecciones tuvieron un resultado mortal. Se debe prestar una atención particular con relación al riesgo de infecciones cuando se trate a pacientes de edad avanzada.

Población pediátrica
Ver "Vacunas".

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN
Adalimumab ha sido estudiado en pacientes con artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis psoriásica tratados con Adalimumab tanto en monoterapia como con metotrexato de forma concomitante, (Cuando se administró Adalimumab junto con metotrexato, la formación de anticuerpos fue inferior en comparación con el uso exclusivo de Adalimumab). La administración de Adalimumab con metotrexato resultó en un incremento de la formación de anticuerpos, del aclaramiento y riesgo de infección de Adalimumab.
La administración conjunta de Adalimumab y anakinra no está recomendada (ver "Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF").
La administración conjunta de Adalimumab y abatacept no está recomendada (ver "Administración concomitante de FAMES biológicos o antagonistas del TNF").

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA
Mujeres en edad fértil
Las mujeres en edad fértil deben considerar utilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos cinco meses tras el último tratamiento con ATENFE®.

Embarazo
En la porteconceptualización de Adalimumab, un gran número de embarazos (aproximadamente 2.100) fueron expuestos a Adalimumab y seguidos de forma prospectiva, resultando en nacimientos con vida conocidos, incluyendo más de 1.500 expuestos durante el primer trimestre, no indican un aumento en la tasa de malformación en el recién nacido.
En un registro de cohortes prospectivo, fueron reclutadas 257 mujeres con artritis reumatoide (AR) o enfermedad de Crohn (EC) tratadas con Adalimumab al menos durante el primer trimestre, y 120 mujeres con AR o EC no tratadas con Adalimumab. La variable principal fue la prevalencia de las principales anomalías congénitas que se dan al nacer. La tasa de embarazos que terminaba en, al menos, un recién nacido vivo con defecto congénito grave fue de 6/69 (8,7%) en mujeres con AR tratadas con Adalimumab y 5/74 (6,8%) en mujeres con AR no tratadas (OR no ajustado 1,31, 95% IC 0,38-4,52) y 16/152 (10,5%) en mujeres con EC tratadas con Adalimumab y 3/32 (9,4%) en mujeres con EC no tratadas (OR no ajustado 1,14, IC 95% 0,31-4,16). El OR ajustado (teniendo en cuenta las diferencias basales) fue de 1,10 (IC del 95% 0,45 a 2,72) para AR y EC combinadas. No hubo diferencias claras entre las mujeres tratadas con Adalimumab y las no tratadas para las variables secundarias de abortos espontáneos, defectos congénitos menores, parto prematuro, tamaño al nacer e infecciones graves u oportunistas, y no se notificaron nacimientos de niños muertos o malformados. Las limitaciones de los datos puede verse afectada debido a las limitaciones metodológicas del estudio, incluyendo el pequeño tamaño de la muestra y el diseño no aleatorizado.
En un estudio de toxicidad para el desarrollo realizado en monos, no hubo indicios de toxicidad materna/fetal, embriotoxicidad o teratogenicidad. No se dispone de datos preclínicos sobre toxicidad postnatal de Adalimumab.
Debido a la inhibición del TNFα, la administración de Adalimumab durante el embarazo podría afectar a la respuesta inmune normal en el recién nacido. Adalimumab solo debe usarse durante el embarazo en caso de ser claramente necesario.
Se ha observado que atraviesa la placenta al suero de niños nacidos de madres tratadas con Adalimumab durante el embarazo. Como consecuencia, estos niños pueden tener un riesgo incrementado de infecciones. No se recomienda la administración de vacunas vivas (p.ej., vacuna BCG) a niños expuestos a Adalimumab en el útero hasta 5 meses después de la última inyección de Adalimumab de la madre durante el embarazo.

Lactancia
La información limitada extraída de la literatura publicada indica que Adalimumab se excreta a través de la leche materna en concentraciones muy bajas con una presencia de Adalimumab en leche humana en concentraciones del 0,1% al 1% del nivel sérico materno. Adalimumab por vía oral, la inmunoglobulina G se somete a proteolisis intestinal y tiene una biodisponibilidad escasa. No se prevén efectos en neonatos / lactantes alimentados con leche materna. En consecuencia, ATENFE® puede usarse durante la lactancia.

Fertilidad
No hay datos preclínicos disponibles sobre el efecto de Adalimumab en la fertilidad.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS
La influencia de ATENFE® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se pueden producir vértigos y alteraciones de la visión tras la administración de ATENFE® (Ver Reacciones Adversas).

REACCIONES ADVERSAS
Resumen del perfil de seguridad
Adalimumab se ha estudiado en 9.506 pacientes en ensayos pivotales controlados y abiertos durante un máximo de 60 meses o más. Estos ensayos clínicos incluyeron pacientes con artritis reumatoide reciente o de larga duración, artritis idiopática juvenil (artritis idiopática juvenil poliarticular y artritis asociada a entesitis) así como con espondiloartritis axial (EA y espondiloartritis axial sin evidencia radiográfica de EA), artritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, psoriasis, HS y uveítis. Los datos están basados en ensayos privados controlados que abarcan 6.089 pacientes tratados con Adalimumab y 3.801 pacientes con placebo o comparador activo durante el periodo controlado.
La proporción de pacientes que interrumpió el tratamiento debido a reacciones adversas durante la fase doble ciego y controlada de los ensayos pivotales fue 5,9 % para los pacientes tratados con Adalimumab y 5,4 % para el grupo control.
Las reacciones adversas notificadas más frecuentemente fueron infecciones (como nasofaringitis, infección del tracto respiratorio superior y sinusitis), reacciones en el lugar de inyección (eritema, picores, hemorragia, dolor o hinchazón), cefalea y dolor musculoesquelético.
Se han notificado reacciones adversas graves con Adalimumab. Los antagonistas del TNF, como Adalimumab, afectan al sistema inmune, y su uso puede afectar a la defensa del cuerpo contra infecciones y cáncer.
Se han notificado también en asociación con el uso de Adalimumab infecciones mortales y que amenazan la vida del paciente (incluyendo sepsis, infecciones oportunistas y tuberculosis), exacerbación del VHB y varios tipos de tumores (incluyendo leucemia, linfoma y linfoma hepatoesplénico de células T). También se han notificado reacciones hematológicas, neurológicas y autoinmunes graves. Estas incluyen notificaciones raras de pancitopenia, anemia aplásica, acontecimientos desmielinizantes centrales y periféricos y notificaciones de lupus, enfermedades relacionadas con lupus y síndrome de Stevens-Johnson.

Población pediátrica
En general, las reacciones adversas en pacientes pediátricos fueron similares en frecuencia y tipo a las observadas en pacientes adultos.
La siguiente lista de reacciones adversas se basa en la experiencia de ensayos clínicos y en la experiencia post comercialización y se enumeran según la clasificación por órganos y por sistemas de MedDRA y frecuencia en la Tabla 7: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las frecuencias incluidas son las más altas
Observadas en las diferentes indicaciones. En los casos en los que se incluye información adicional en las secciones 4.3, 4.4, 4.8, aparece un asterisco (*) en la columna sistema de clasificación de órganos.

Clasificación por órganos y Sistemas	Frecuencia	Reacciones Adversas
Infecciones e infestaciones*	Muy Frecuentes	Infecciones del tracto respiratorio (incluyendo infecciones respiratorias del tracto inferior y superior, neumonía, sinusitis, faringitis, Nasofaringitis y neumonía por herpes viral).
	Frecuentes	Infecciones sistemáticas (incluyendo sepsis, candidiasis y gripe), infecciones intestinales (incluyendo gastroenteritis viral), infecciones de la piel y tejido blando, (incluyendo paroniquia, celulitis, impétigo, fascitis necrotizante y herpes zoster), Infección de oídos, Infecciones bucales (incluyendo herpes simple, herpes oral e infecciones dentales), Infecciones del tracto reproductor (incluyendo infección micótica vulvovaginal), Infecciones del tracto urinario (incluyendo pielonefritis), Infecciones fúngicas, Infecciones de las articulaciones
	Poco frecuentes	Infecciones neurológicas (incluyendo meningitis viral), Infecciones oportunistas y tuberculosis (incluyendo coccidioidomicosis, histoplasmosis, infecciones por el complejo mycobacterium avium), Infecciones bacterianas, Infecciones oculares, Diverticulitis*
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluyendo quistes y pólipos).*	Frecuentes	Cáncer de piel excluido el melanoma (incluyendo carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas), Neoplasia benigna
	Poco frecuentes	Linfoma**, Neoplasia de órganos sólidos (incluyendo cáncer de mama, neoplasia pulmonar y neoplasia tiroidea), Melanoma**
	Raras	Leucemia**
	No conocida	Linfoma hepatoesplénico de células T[1]
Trastornos de la sangre y del Sistema Linfático*	Muy Frecuentes	Carcinoma de células de Merkel (carcinoma neuroendocrino de la piel)[2], Sarcoma de Kaposi
	Frecuentes	Leucopenia (incluyendo neutropenia y agranulocitosis), Anemia
	Frecuentes	Leucocitosis, Trombocitopenia
	Poco frecuentes	Púrpura trombocitopénica idiopática
	Raras	Pancitopenia
Trastornos del sistema inmunológico*	Frecuentes	Hipersensibilidad, Alergias (incluyendo alergia estacional)
	Poco frecuentes	Sarcoidosis[3], Vasculitis
	Raras	Anafilaxia *
Muy frecuente	Incremento de líquidos	
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Frecuentes	Hipopotasemia, Incremento de ácido úrico, Sodio plasmático anormal, Hipocalcemia, Hiperglucemia, Hipofosfatemia, Deshidratación
Trastornos psiquiátricos	Frecuentes	Cambios de humor (incluyendo depresión) Ansiedad, Insomnio
Trastornos del sistema nervioso*	Muy frecuentes	Cefalea
	Frecuentes	Parestesias, (incluyendo hipoestesia), Migraña, Compresión de la raíz nerviosa
	Poco frecuentes	Accidente cerebrovascular[4], Temblor, Neuropatía
	Raras	Esclerosis múltiple, Trastornos desmielinizantes (por ejemplo, neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré)[5]
Trastornos oculares	Frecuentes	Alteración visual, Conjuntivitis, Blefaritis, Hinchazón de ojos
	Poco frecuentes	Diplopia
Trastornos del oído y del laberinto	Frecuentes	Vértigo
	Poco frecuentes	Sordera, Tinnitus
Trastornos cardiacos*	Frecuentes	Taquicardia
	Poco frecuentes	Infarto de miocardio[6], Arritmia, Insuficiencia cardiaca congestiva
	Raras